

IHRE BESTELLUNG

FAX: +49 (0)6821 5016521 • E-Mail: order.nk@movianto.com

Name der zubeliefernden
Krankenhausapotheke: _____

Referenz- und/oder Bestellnummer: _____

Ihre Kundennummer (ab 2. Bestellung): _____

Besteller/in: _____

Straße: _____ Telefon: _____

PLZ und Ort: _____ Fax: _____

E-Mail: _____

IHRE BESTELLUNG			
Produkt	PZN	Verpackungseinheit	Menge
Cefiderocol (FETCROJA®)	16325862	1 Faltschachtel (10 Vials à 1g)	

Lieferkosten werden von der Shionogi GmbH übernommen

Lieferadresse

Rechnungsadresse (falls abweichend)

Die Ware wird von unserem 3PL-Dienstleister Movianto versendet.
Die Shionogi GmbH verfügt über eine Großhandelserlaubnis (Nr. 5384/11-Shionogi GmbH/02),
ausgestellt am 12.08.2021 vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) Berlin

Shionogi GmbH • Neustädtische Kirchstraße 6 • 10117 Berlin • Tel.: +49 (0)30 2062980-10

Dokument-ID des Formblattes	Version gültig ab	Titel des Formblattes	Seite
SDE-QA-SOP-016-F01	V2.0_2023-04-01	Bestellformular Fetcroja	1 von 1

Abgekürzte Verschreibungsinformation für Fetcroja 1 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung – Wirkstoff: Cefiderocol - bitte konsultieren Sie v. d. Verschreibung d. vollständige Fachinformation.

Zusammensetzung: 1 Durchstechfl. enth. Cefiderocolsulfatossilat entspr. 1 g Cefiderocol. **Sonstige Bestandteile:** Saccharose, Natriumchlorid (7,64 mmol, etwa 176 mg), Natriumhydroxid. **Anwendungsgebiete:** Behandl. v. Infektionen bei Erwachsenen durch aerobe gramnegative Erreger, wenn nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gg. den Wirkstoff, einen d. sonstigen Bestandteile, od. Cephalosporin-Antibiotika; schwere Überempfindlichkeit (z.B. anaphylaktische Reaktion, schwere Hautreaktion) gg. andere Arten von Betalactam-Antibiotika (z.B. Penicilline, Monobactame od. Carbapeneme). **Nebenwirkungen:** Häufig: Candidiasis, einschließl. orale Candidose, vulvovaginale Candidose, Candida i. Urin u. Candida-Infektion, Clostridioides difficile-Kolitis, einschließl. pseudomembranöse Kolitis u. Clostridioides difficile-Infektion, Husten, Diarrhö, Übelkeit, Erbrechen, Ausschlag, einschließl. makulöser Ausschlag, Ausschlag makulo-papulös, erythematöser Hautausschlag u. Medikamentenausschlag, Reaktion a. d. Infusionsstelle, einschließl. Schmerzen a. d. Infusionsstelle, Erythem a. d. Infusionsstelle u. Phlebitis a. d. Injektionsstelle, Alaninaminotransferase, Gamma-Glutamyltransferase u./od. Aspartataminotransferase erhöht, Leberfunktion anomal, einschließl. Leberfunktionstest erhöht, Leberenzym u./od. Transaminasen erhöht und Leberfunktionstest anomal, Kreatinin im Blut erhöht. Gelegentl.: Überempfindlichkeit, einschließl. Hautreaktionen u. Pruritus, Harnstoff im Blut erhöht. Nicht bekannt: Neutropenie. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Antibiotika zur systemischen Anwendung. ATC-Code: J01DI04. **Verschreibungspflichtig bzw. rezept- und apothekenpflichtig. Z.Nr.:** EU/1/20/1434/001.

Weitere Angaben zu Dosierung, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung sind der „Austria-Codex-Fachinformation“ zu entnehmen.

Zulassungsinhaber: Shionogi B.V., Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Niederlande. Weitere Informationen zu Fetcroja 1 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung erhalten Sie bei Shionogi GmbH, Berlin, Deutschland, Tel.: + 49 (0) 30 2062 980 66.

Stand d. Information: August 2022.